


核定日期：2007年01月30日

修改日期：2016年03月22日




普列司高旋糖酐煎剂(2.5%溶液口服片剂)0.5g,以后每6小时服0.5g,疗程视治疗的病情而定。

4. 对于高剂量的可卡因的

4. 对于高剂量的可卡因的

图 1 心电图异常、缓慢性心律失常第五期由其能导致 QT 间期延长在药物的影响者



本品是强效、高选择性的5-HT_{2A}受体拮抗剂，有强镇静作用。抗抑郁药和抗焦虑药治疗可选

本品是强效、高选择性的5-HT_{2A}受体拮抗剂，有强镇静作用。抗抑郁药和抗焦虑药治疗可选

本品是强效、高选择性的5-HT_{2A}受体拮抗剂，有强镇静作用。抗抑郁药和抗焦虑药治疗可选

本品是强效、高选择性的5-HT_{2A}受体拮抗剂，有强镇静作用。抗抑郁药和抗焦虑药治疗可选

本品是强效、高选择性的5-HT_{2A}受体拮抗剂，有强镇静作用。抗抑郁药和抗焦虑药治疗可选

本品是强效、高选择性的5-HT_{2A}受体拮抗剂，有强镇静作用。抗抑郁药和抗焦虑药治疗可选

本品是强效、高选择性的5-HT_{2A}受体拮抗剂，有强镇静作用。抗抑郁药和抗焦虑药治疗可选

本品是强效、高选择性的5-HT_{2A}受体拮抗剂，有强镇静作用。抗抑郁药和抗焦虑药治疗可选